

СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ С ДВОЙНЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ ВОДОРОДОМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Распорядительный директор больницы Ириэ
Сообщества Сёто
Медицинской корпорации
Ириэ Ёсикадзу




Метод исследования А

Пациенту, больному атопическим дерматитом, давали пить воду с двойным обогащением водородом 330 мл за 1 раз, 3 раза в день, 3 месяца. Сравнивали показатели исследования: IgE, перекисное окисление липидов (ПОЛ).

Случай болезни 1

Женщина, 25 лет. Болеет с детства. Пораженные части тела: голова, подбородок, руки, живот.

	Начало	Через 3 месяца	
IgE	2100 IU/мл	1500 IU/мл	↓
Перекисное окисление липидов (ПОЛ)	3,1 нмоль/мл	1,7 нмоль/мл	↓



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вода с двойным обогащением водородом способствует улучшению состояния кожи. Показатели IgE и ПОЛ значительно снизились

Метод исследования В


Были проведены исследования с пациентами, больными атопическим дерматитом. Сравнивался внешний вид мокнущей экземы и дерматита.

Способы исследования:

1. Внутреннее применение воды с двойным обогащением водородом 330 мл за 1 раз, 3 раза в день.
2. Компрессы на пораженные места водой с двойным обогащением водородом.

Случай болезни 1.

Мужчина, 34 года. Лечение - 4 недели.



До применения водородной воды



Спустя 4 недели после применения водородной воды

Случай болезни 2.

Женщина, 25 лет.
Лечение - 4 недели.



До применения водородной воды



Спустя 4 недели после применения водородной воды