

МЫ БРОСАЕМ ВЫЗОВ НЕВОЗМОЖНОМУ И НЕОБЪЯСНИМОМУ

Директор НИИ анализа болезней
Распорядительный директор, вице-директор
больницы Ацуки Сато сообщества Това
Тадао Хосино



Метод исследования

Здоровые люди и больные сахарным диабетом выпивали за 1 раз 330 мл воды с двойным обогащением водородом в течение 3-х месяцев, сдавая 1 раз в неделю анализ крови. Полученные показатели сравнивались.

Предмет исследования: AST, ALT, γ-GPT, BUN, Cr, UA, T-Cho, HDL-Cho, TG, Glucose, GHB, GA.

На основании симптоматического анализа, анализа периферической крови, биохимического анализа крови исследовали наличие/отсутствие кратковременного токсического эффекта.

Испытуемый 1. 65 лет, мужчина, здоров. Принимаемые лекарства: нет.

Испытуемый 2. 52 года, женщина. Сахарный диабет, гиполипидемия. Принимаемые лекарства: Даонил, Воглибоз, Липитор.




Таблица окислительно-восстановительного потенциала

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам симптоматического анализа, анализа периферической крови, биохимического анализа крови стало ясно, что вода с двойным обогащением водородом абсолютно не является токсичной.

Вода с двойным обогащением водородом не причиняет вреда здоровью и может быть безопасно использована внутрь. Кроме того, не вызывает расстройства желудка, а также прочих краткосрочных токсических состояний